
Elenco dei rettili (classe Reptilia Laurenti, 1768) presenti nei Boschi di Muzzana del Turgnano e nei territori limitrofi

A cura del dott. Luca Lapini del Museo Friulano di Scienze Naturali

Aggiornamento al 2019

NB: La LR 9 del 23 aprile 2007, art. 10, protegge tutti i rettili autoctoni presenti sul territorio regionale.

Ordine: Testudines Linnaeus, 1758 (=Chelonia)

Famiglia	Genere	Specie	Sottospecie	Nome volgare	Nome friulano (variante locale)
Emydidae Rafinesque, 1815	<i>Emys Duméril,</i> 1805	<i>Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)</i>		Testuggine palustre europea ¹	

¹ Frequente sia all'interno dei boschi, sia nelle scoline perimetrali, nelle quali si riproduce. La specie è ancora abbastanza comune in molte zone della bassa friulana, ma le popolazioni dei boschi rappresentano una emergenza naturalisticamente notevole di questi ambienti. Protetta dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. II e IV).

Ordine: Squamata Merrem, 1820

Sottordine: Sauria MacCartney, 1802

Famiglia	Genere	Specie	Sottospecie	Nome volgare	Nome friulano (variante locale)
Lacertidae Opper, 1811	<i>Lacerta Linnaeus,</i> 1758	<i>Lacerta viridis (Laurenti, 1768)</i> (inclusa <i>L. bilineata Daudin, 1802</i>)		Ramarro ¹	
Lacertidae Opper, 1811	<i>Podarcis Wagler,</i> 1830	<i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i>		Muraiola, Lucertola dei muri ²	
Anguidae Opper, 1811	<i>Anguis Linnaeus,</i> 1758	<i>Anguis veronensis Pollini, 1818 (fino al 2013 incluso in A. fragilis Linnaeus, 1758)</i>		Orbettino italiano ³	

¹ Sicuramente il lacertide dominante nei boschi, predilige le radure e i margini forestali. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

² Frequente lungo i margini e sulle infrastrutture antropiche presenti nei boschi. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

³ La specie è molto comune nei boschi. Endemita italico recentissimamente splittato da *fragilis*, per ora è indirettamente protetto soltanto da una legge della Regione Friuli Venezia Giulia (LR 9 del 23 aprile 2007, art. 10). Nel territorio regionale è presente anche *Angui fragilis*, che allo stato attuale delle conoscenze pare essere presente su Alpi e Prealpi Carniche e Giulie e sul Carso triestino. Mancano tuttavia ancora dettagli distributivi.

Ordine: Squamata Merrem, 1820

Sottordine: Serpentes Linnaeus, 1758

Famiglia	Genere	Specie	Sottospecie	Nome volgare	Nome friulano (variante locale)
Colubridae Opper, 1811	<i>Coronella Laurenti, 1768</i>	<i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i>		Colubro liscio ¹	
Colubridae Opper, 1811	<i>Hierophis Fitzinger, 1843</i>	<i>Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)</i>		Biacco maggiore, Carbone ²	
Colubridae Opper, 1811	Zamenis Wagler, 1830	<i>Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)</i>		Saettone comune, Magna ³	
Natricidae Bonaparte, 1838	<i>Natrix Laurenti, 1768</i>	<i>Natrix natrix (Linnaeus, 1758)</i>		Natrice dal collare ⁴	
Natricidae Bonaparte, 1838	<i>Natrix Laurenti, 1768</i>	<i>Natrix tessellata (Laurenti, 1768)</i>		Natrice tassellata ⁵	
Viperidae Laurenti, 1768	<i>Vipera Garsault, 1764</i>	<i>Vipera aspis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Vipera aspis francisciredi Laurenti, 1768</i>	Vipera comune di Francesco Redi ⁶	

¹ La specie è relativamente frequente nei boschi, ma tende a concentrarsi negli habitat più drenati. Nella zona di Muzzana è molto comune lungo la massicciata ferroviaria. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

² In gran parte dei boschi la specie è sporadica, perché predilige habitat più asciutti. Tende a concentrarsi lungo la massicciata ferroviaria che lambisce il paese di Muzzana del Turgnano. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

³ Piuttosto frequente in tutti i boschi della zona. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

⁴ Estremamente comune in tutti i boschi della zona. Protetto soltanto da una legge della Regione Friuli Venezia Giulia (LR 9 del 23 aprile 2007, art. 10).

⁵ Dai dati a disposizione questa specie prevalentemente ittiofaga sembra essere presente soltanto dove il fiume Turgnano lambisce il Bosco Baredi-Selva di Arvonchi. Protetto dal D.P.R. 357/1997 e particolarmente tutelato dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE (All. IV).

⁶ Abbastanza frequente, predilige i margini forestali e le macchie di rovo esposte a Sud. Protetto soltanto da una legge della Regione Friuli Venezia Giulia (LR 9 del 23 aprile 2007, art. 10).